Diät-Alleinfuttermittel zur Auflösung von Struvitsteinen. Verringerung von Struvitsteinrezidiven. Erkrankung der unteren Harnwege bei Katzen.

## EINSATZBEREICH

- Auflösung und Reduktion des Wiederauftretens von Struvitsteinen
- Reduktion der Neubildung von Struvit- und Kalziumoxalat-Kristallen
- Reduktion von Erkrankungen der unteren Harnwege bei Katzen (FLUTD), inklusive idiopathischer Cystitis und Urethra-Pfropfen
- Tägliche Nahrung für erwachsene Katzen bis 8 Jahre

ADVANCED FISH OIL FORMULA™ CLINICALLY PROVEN

400 g | 2 kg | 7 kg

# SPECIFIC™ FCD CRYSTAL MANAGEMENT

## GRUNDLAGEN FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG

RSS Struvite / RSS Oxalate — *Low RSS struvite & oxalate*

**Niedrige RSS-Werte** (Relative Super Saturation) **für Struvit und Kalziumoxalat:** Untersättigung bzw. metastabile Sättigung des Urins zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Minimierung des Risikos für die Neubildung von Struvit- und Kalziumoxalat-Kristallen im Urin.

*Reduction of struvite recurrence*

Das Diät-Alleinfutter hat einen **reduzierten Magnesium- und Phosphorgehalt** (Komponenten der Struvitsteine) für die Reduktion der Gefahr des Wiederauftretens von Struvitkristallen und -steinen.

pH 6.0-6.3 — *Urine pH control*

Ein induzierter **pH-Wert des Urins unter 6.4** löst existierende Struvitsteine auf und beugt der Entstehung neuer Struvitsteine vor.

*High digestibillity*

**Hochwertige und leicht verdauliche Bestandteile** gewähren eine maximale Aufnahme der Nährstoffe aus dem Futter, während die Kotmenge reduziert wird.

*Skin, coat & joint support*

**EPA** und **DHA** sind Omega-3-Fettsäuren, welche Haut- und Fellfunktionen und die Gelenke unterstützen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Durch die Aufteilung der täglichen Futtermenge von SPECIFIC™ FCD Crystal Management auf 3 oder 4 Mahlzeiten, kann der **postprandiale Anstieg** des **Urin-pHs verringert** werden.
- Struvit-Urolithiasis ist nur eine Art von Urolithiasis, die bei Katzen vorkommen kann. Eine genaue Abklärung der Steintypen ist wichtig, da die verschiedenen Arten unterschiedliche Diätstrategien benötigen.
- Die Zusammensetzung und der hohe Energiegehalt in SPECIFIC™ FCD Crystal Management macht die Diät außerdem zu einer ausgezeichneten Nahrung für gesunde erwachsene Katzen mit einem leicht erhöhten Energiebedarf. Die **hochverdaulichen und ausgewogenen Bestandteile** versorgen erwachsene Katzen mit allen notwendigen Nährstoffen für ein gesundes Leben.

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- Zur Reduktion der Gefahr des Wiederauftretens von Harnsteinen aus Kalziumoxalat, Ammoniumurat oder Cystin wird SPECIFIC™ FKD/FKW Kidney Support empfohlen.
- Für übergewichtige Katzen mit der Neigung zu Struvit-Urolithiasis wird empfohlen, SPECIFIC™ FCD-L Crystal Management Light, SPECIFIC™ FXD Adult oder SPECIFIC™ FRD Weight Reduction zu verabreichen.
- Für Katzen mit rezidivierender idiopathischer Cystitis ist ein Feuchtfutter empfehlenswert (SPECIFIC™ FCW Crystal Management oder SPECIFIC™ FXW Adult).

## NÄHRSTOFFGEHALT

| Inhaltsstoffe | Gehalt pro 100 g | Gehalt pro MJ |
|---|---|---|
| Umsetzbare Energie kJ | 1747 | |
| Rohprotein g | 32.0 | 18.3 |
| Rohfett g | 20.0 | 11.4 |
| Kohlenhydrate g (NFE) | 33.0 | 18.9 |
| Rohfaser g | 1.7 | 1.0 |
| Kalzium g | 0.70 | 0.40 |
| Phosphor g | 0.63 | 0.36 |
| Magnesium g | 0.060 | 0.034 |
| Natrium g | 0.42 | 0.24 |
| Omega-3-Fettsäuren g | 0.98 | 0.56 |
| Verhältnis Ω-3:Ω-6 | 1:3 | 1:3 |
| Chondroitinsulfat mg | 100 | 57 |
| Wasser g | 7.3 | |

## NICHT EMPFOHLEN FÜR

- Gleichzeitige Verabreichung von harnansäuernden Substanzen.
- Welpen unter 6 Monate und trächtige oder laktierende Kätzinnen.
- Metabolische und renale Azidose.

## ZUSAMMENSETZUNG

Fischmehl, Maisprotein, Schweinefett, Mais, Weizen, Kartoffelprotein, Eipulver, Reis, Maisstärke, hydrolysiertes tierisches Protein, Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente (Spurenelemente als Chelate), Fischöl, pulverisierte Zellulose, Plantago Samen (Flohsamen), Chondroitinsulfat.
Mit natürlichen Antioxidationsmitteln (Tocopherole, Rosmarin-Extrakt, Vitamin C). Enthält keine zugesetzten künstlichen Farb- oder Aromastoffe.

## FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG IN GRAMM PRO TAG

Der individuelle tägliche Bedarf kann, abhängig von Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Aktivität etc., variieren. Es ist darum empfehlenswert, den Allgemeinzustand und das Körpergewicht zu überwachen und die Futtermenge dementsprechend anzupassen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| kg | g | g | g |
| 1 | 25 | 20 | 15 |
| 2 | 40 | 30 | 25 |
| 3 | 50 | 40 | 30 |
| 4 | 60 | 45 | 35 |
| 5 | 70 | 55 | 40 |
| 6 | 80 | 60 | 50 |
| 7 | 90 | 65 | 55 |
| 8 | 95 | 70 | 60 |
| 9 | 105 | 80 | 65 |
| 10 | 110 | 85 | 65 |
| 11 | 120 | 90 | 70 |
| 12 | 125 | 95 | 75 |

VERSION 07-2018