

## Pulver zum Eingeben

Für Tiere: Ziervögel, Brieftauben, Kleinnager, nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Kaninchen, Frettchen und Terrarientiere (Reptilien)



### Wirkstoffe in 1 g Pulver:

Lactobacillus fermentum, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 14931  
Lactobacillus casei, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 7469  
Enterococcus faecium M-74, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 19434  
Lactobacillus plantarum, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 14917  
Lactobacillus acidophilus, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 4356  
Pediococcus acidilactici, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 25740  
Bifidobacterium bifidum, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 15696  
entspr. insgesamt 25 Mio. KBE\*/g (\*= Kolonie-bildende Einheiten)

### Sonstige Bestandteile:

Fructooligosaccharide  
Maltodextrin  
Glucose  
Natrium-Aluminium-Silicat

### Anwendungsgebiete

Unterstützende Behandlung von Diarrhoe (Durchfall) und Infektionskrankheiten; Stabilisierung der Darmflora in Stresssituationen, bei Futterumstellung, Aufzucht und während/nach Antiinfektivtherapie.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Folgende Mengen Bene-Bac Pulver werden unter das Futter gemischt:

Körpergewicht	Pulvermenge pro Tag
bis 50 g	0,325 g = 1/8 gestr. Teelöffel = 1/2 Messlöffel
50 – 250 g	0,65 g = 1/4 gestr. Teelöffel = 1 Messlöffel
250 – 1000 g	1,3 g = 1/2 gestr. Teelöffel = 2 Messlöffel
> 1000 g	2,6 g = 1 gestr. Teelöffel = 4 Messlöffel

### Unterstützende Behandlung der Diarrhoe:

Täglich bis einige Tage nach klinischer Besserung.

### Zusatztherapie in Stresssituationen:

2-mal im Abstand von 3 Tagen vor Futterumstellung bzw. zu erwartender Stresssituation sowie weitere 2-mal danach verabreichen.

### Während/nach Antiinfektiva-Therapie:

Täglich/alle 2 Tage bis einige Tage nach Absetzen des Antiinfektivums.

### Erhaltung der Widerstandskraft/Während der Aufzucht:

1-mal wöchentlich.

Bene-Bac Pulver kann über Feuchtfutter und Obst gestreut werden. Zur besseren Haftung des Pulvers kann Trockenfutter mit Wasser oder Speiseöl angefeuchtet werden. Behandeltes Futter max. 8 Stunden anbieten, danach entfernen. Leere Futtergefäße gründlich reinigen.

### Gegenanzeigen/Nebenwirkungen

Keine bekannt. Falls Nebenwirkungen auftreten sollten, bitte dem Tierarzt oder Apotheker melden.

### Lagerungshinweis

Unter 20 °C aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen. Nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind zusammen mit dem Hausmüll zu entsorgen. Es ist sicherzustellen, dass hierbei kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand: 17.12.2018

Pharmazeutischer Unternehmer: Albrecht GmbH, Hauptstr. 6 - 8, 88326 Aulendorf

### Handelsformen

Dose mit 127 g