

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

Vorwiegend Elektrolyte (Natrium, Kalium und Chloride), leicht verdauliche Kohlenhydrate*



- Immunglobuline aus Hühnerei (IgY)
- Hoch verfügbare Energie aus Dextrose
- Elektrolyte zum Ausgleich der Verluste
- Vitamine

Seit langer Zeit ist bekannt, dass Hühnereier erfolgreich zur Bekämpfung von Durchfällen bei anderen Tierarten eingesetzt wurden. Hintergrund ist, dass Hühner zum Schutz ihrer Küken Antikörper ins Ei abgeben. Wenn Hühner im engen Kontakt mit anderen Tieren (z. B. Kälbern) leben, sind sie spezie fremden Krankheitserregern ausgesetzt und produzieren so auch entsprechende Antikörper.

Durchfallrelevante Keime bei Kälbern sind:

- Coronavirus
- Escherichia coli
- Rotavirus
- Kryptosporidien
- Salmonella typhimurium
- Salmonella dublin
- Clostridien Typ A & C

Zusammensetzung

Traubenzucker*, Natriumbikarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Hefeprodukt, Eiprodukte (getrocknet) 2,50 %

Inhaltsstoffe

Rohprotein	3,50 %
Rohöle und -fette	1,80 %
Rohfaser	0,40 %
Rohasche	40,00 %
Natrium	7,60 %
Kalium	4,00 %
Chlorid	8,50 %

Zusatzstoffe je kg

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin A (E672)	200.000 I.E.
Vitamin D ₃ (E671))	20.000 I.E.
Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700))	2.000 mg
Vitamin B ₁ (Thiaminmononitrat)	25 mg
Vitamin B ₂ (Riboflavin-5'-phosphatester, Mononatriumsalz)	50 mg
Vitamin B ₃ (Pyridoxinhydrochlorid (3a831))	30 mg
Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	400 mcg
Vitamin K	12 mg
Vitamin C (3a300)	400 mg
Folsäure (3a316)	5 mg
Niacinamid (3a315)	250 mg
Calcium-D-Pantothenat (3a841)	125 mg

Konservierungsmittel:

Calciumformiat (E238)	40.000 mg
-----------------------	-----------

Fütterungsempfehlung

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) 2 x täglich 25 g in die Milchtränke einrühren (25 g = 1 gehäufte Messlöffel).

Bei starkem Durchfall Dosierung verdoppeln (2 x täglich 50 g).

Empfohlene Fütterungsdauer: 1 - 7 Tage.

Fütterungshinweis

Nur an Kälber bis zu 25 v. H. der Tagesration verfüttern. Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall). Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Kühl (max. 25° C), frostfrei und lichtgeschützt lagern. Nach Anbruch schnellstmöglich aufbrauchen.

Handelsform

Beutel mit 2,0 kg

Ig-PRO® C acute ist ein pulverförmiges Diät-Ergänzungsfuttermittel mit den Inhalts- und Zusatzstoffen, die ein Kalb bei Durchfall benötigt: