INCIDIN RAPID – Flächendesinfektion

Die hocheffiziente, reinigende Oberflächendesinfektion - aldehydhaltig

· wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren **· *jedoch* frei von Formaldehyd**

Wirkstoffe (Konzentrat): 9,8 % Glutaral, 5,0 % Benzalkoniumchlorid, 5,0 % Didecyldimethylammoniumchlorid

Anwendungsgebiet

- Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und von Flächen aller Art

Anwendungsempfehlung

- Lösung mit Wasser (max. 30 °C) verdünnen
- Viruzid auch bei Standardkonzentrationen und wirksam gegen Clostridium difficile

Mikrobiologische und virologische Prüfergebnisse für den Bereich Praxis		Konzentration	Einwirkzeit
Flächendesinfektion gemäß VAH mit Mechanik	Clean & dirty conditions	0,25 % 0,5 %	1 Stunde 30 Minuten
	Clean conditions	0,75 %	5 Minuten
	Dirty conditions	1,0 %	5 Minuten
EN 16615 (bakterizid, levurozid) (Dirty conditions)		0,25 % 0,75 %	60 Minuten 5 Minuten
begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV)*		0,25 %	5 Minuten
Viruzid gemäß (RKI-Empfehlung 01/2014)*		0,75 %	30 Minuten
Adeno*		0,25 %	5 Minuten
Papova*		0,25 %	30 Minuten
Rota* *(DVV 2008)		0,25 %	15 Minuten
EN 14476 (viruzid) (Dirty condtions) EN 14476 (viruzid) (Clean conditions) EN 14476 (Adendo) (Clean & dirty conditons) EN 14476 (Noro MNV) (Clean conditons) (Dirty conditions) EN 14476 (begrenzt viruzid Plus) (Dirty conditions) (Clean conditons)		1,0 % 0,5 % 0,75 % 1,5 % 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % 0,5 %	60 Minuten 30 Minuten 15 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 30 Minuten 30 Minuten 5 Minuten
Sporizid (Clostridium difficile), Methode EN 16615		2 %	1 Stunde
Desinfektion von Atemschutzgeräten/-Zubehör im Tauchbad nach EN 14561 / EN 14562 / (bakterizid / levurozid) (Dirty conditions)		1,5 %	15 Minuten

Handelsform: 2 L Griff-Flasche · 6 L Kanister**
**(Dosierpumpe (20 ml) ggf. separat bestellen)