## HÄNDEDESINFEKTION

### SKINSEPT F – Hand- und Hautantiseptik in einem Produkt

**· hochwirksam · farblos · jodfrei**

**Wirkstoffe:**
**70,0 % 2-Propanol, 0,5 % Chlorhexidinbis-(D-Gluconat), 1,5 % Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %**

**Handantiseptik:** **Hygienische und chirurgische Händedesinfektion**
**Hautantiseptik:** **Vor Injektionen, Punktionen und Operationen**

- Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Pilze
- Begrenzt viruzid und wirksam gegen Rotaviren
- RKI-gelistet, DGHM-zertifiziert
- Hygienische Händedesinfektion:
  3 ml über 1/2 Min. in den Händen verreiben
- Chirurgische Händedesinfektion:
  Mindestens 2 x 5 ml insgesamt über 3 Min. in den Händen verreiben. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit feucht gehalten werden.
- Bei Kontamination mit Rotaviren:
  Hände mit dem Produkt 1,5 Min. feucht halten (ca. 3 ml).

**Handelsformen:** **350 ml Sprühflasche · 500 ml Flasche* · 1 L Flasche* · 5 L Kanister***
*(Dosierpumpe (1 ml bzw. 20 ml) bzw. Wandspender ggf. separat bestellen)

**SKINSEPT® F - Zusammensetzung:** 100 g Skinsept® F enthalten: Wirkstoffe: 70,0 g 2-Propanol, 0,5 g Chlorhexidinbis(D-gluconat), 1,5 g Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %, Sonstige Bestandteile: Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser - **Anwendungsgebiete:** Gebrauchsfertige Lösung für die Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Impfungen, hygienische und chirurgische Händedesinfektion. - **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Zur Wundantiseptik nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe. - **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen, Flammpunkt (nach DIN 51755): 20 °C; Anwendungsdauer und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt bei der Hautantiseptik mindestens 1 Minute antrocknen lassen. Verätzungen der Haut wurden nach topischer Anwendung mit Chlorhexidindigluconat bei Neugeborenen und Säuglingen beobachtet. Frühgeborene scheinen aufgrund der Unreife der Hautbarriere besonders gefährdet zu sein. Daher sollte Skinsept® F nur bei Neugeborenen und Säuglingen eingesetzt werden, wenn es keine therapeutische Alternative gibt und der zu erwartende Nutzen die Risiken überwiegt. Es wird empfohlen, die überschüssige Flüssigkeit umgehend zu entfernen. - **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Die gleichzeitige Anwendung von anionischen Tensiden kann zu Inaktivierung von Chlorhexidin führen. - **Nebenwirkungen:** Selten (weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10000 Behandelten) treten Urtikaria und allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auf. Häufig (weniger als 1 von 10, aber mehr as 1 von 100 Behandelten) können irritative Hautreaktionen und Kontaktdermatitis auftreten. Eine kurzzeitige Rötung der Haut ist in den meisten Fällen bedeutungslos und verschwindet von selbst. Verätzungen der Haut wurden bei Neugeborenen und Säuglingen für chlorhexidinhaltige Produkte beobachtet (Häufigkeit unbekannt). Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. - **Zul.-Nr.:** 2142.00.00 **- Stand der Information**: 04/2019