CIMI®-LAC

selectavet
Dr. Otto Fischer GmbH

Milchaustauschfuttermittel für Katzen – Alleinfutter

Die Milch nach Katzenart mit Taurin und Biotin

Zusammensetzung
Öle und Fette (pflanzlich), Milch u. Molkereierzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Eier und Eiererzeugnisse, Mineralstoffe

Analytische Bestandteile
Rohprotein 29,0 %, Rohfett 22,0 %, Rohfaser 1,0 %, Rohasche 6,8 %

Zusatzstoffe je kg
Vitamine:
Vitamin A 40.000 I.E., Vitamin D als Vitramin D_3 2.000 I.E., Vitamin E 50 mg, Vitamin B_1 4 mg, Vitamin B_2 7 mg, Vitamin B_6 4 mg, Vitamin B_{12} 30 mcg, Niacin 35 mg, Calcium-D-Pantothenat 8 mg, Folsäure 1 mg, Cholinchlorid 500 mg, Biotin 1.000 mcg, Taurin 500 mg, Vitamin C 100 mg,
Spurenelemente:
Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat 0,64 mg, Zink als Zinkoxid 1,2 mg
Aminosäuren:
L-Lysin-Monohydrochlorid, technisch rein 2.500 mg, L-Methionin 1.000 mg

Zubereitung der Tränke
CIMI®-LAC in heißes, aber nicht mehr kochendes Wasser einrühren. Kleinere Mengen in einem Fläschchen aufschütteln. Jeden Tag gesondert zubereiten. Nur körperwarm füttern!

	CIMI®-LAC	Wasser
Aufzucht bis 3. Lebenswoche	1 TL	3 TL
Aufzucht ab 4. Lebenswoche	2 EL	3 - 4 EL
Kraftnahrung für tragende, säugende Muttertiere	2 EL	4 EL
Stärkungsmittel für kranke und schwache Katzen	5 EL	3/4 Tasse

CIMI®-LAC mit leicht gehäuftem Tee- oder Eßlöffel abmessen.

Fütterungsanweisung
Kätzchenaufzucht bis zur 3. Woche
Die körperwarme cimi®-Nährmilch wird nach folgenden Richtlinien gefüttert:

Lebensalter	cimi®-Nährmilch je Fütterung	Anzahl der Fütterungen bei mutterloser Aufzucht
1 - 3 Tage 4 - 7 Tage	1 TL 1-2 TL	alle 2 Std., nachts 3 mal (10 - 12 mal)
8 - 9 Tage 10 Tage	2 TL 2-3 TL	alle 2 Std. (10 mal)
11 - 14 Tage 15 - 21 Tage	4-5 TL 5 TL	alle 2 - 3 Std. (8 mal)

Ganz junge Kätzchen werden zunächst mit einer Tropfpipette, größere mit einer Saugflasche gefüttert.
Für die Fütterung zusätzlich zur Muttermilch gelten die gleichen Angaben. Die Anzahl der Fütterungen ist von der jeweiligen Situation abhängig (Milchleistung des Muttertieres, Alter der Kätzchen).

Aufzucht ab der 4. Lebenswoche
Ausgehend von der Fütterungsempfehlung für die 3. Lebenswoche wird CIMI®- LAC – je nach Alter und Entwicklungsstand – in langsam steigenden Mengen neben der ersten festen Nahrung gefüttert. Die Tagesration sollte anfangs auf 6, später auf 4 Mahlzeiten verteilt werden.

Kraftnahrung für tragende oder säugende Muttertiere / Stärkungsmittel für kranke und schwache Katzen
Erwachsene Katzen erhalten – je nach Appetit – etwa 1/2 - 1 Kaffetasse CIMI®- LAC-Milch oder mehr. Anfangs sollten kleine Portionen angeboten werden (Gewöhnungsfütterung).

Hinweis
Diese Angaben stellen Erfahrungswerte dar, die den Gegebenheiten der Praxis anzugleichen sind.

Handelsform
Dose mit 250 g Pulver

CIMI®- LAC ist eine spezielle Nährmilch für Katzen und eignet sich durch seine artspezifische Zusammensetzung für
- die mutterlose Kätzchenaufzucht
- als Beifutter für Katzenwelpen
- als Kraftnahrung für tragende und säugende Muttertiere
- als Stärkungsmittel für kranke und schwache Katzen (FA.13)